

CRIAÇÃO DE BEZERRAS EM SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE LEITE

POR QUE CRIAR BEM?

- O BEZERRO PERDE A PROTEÇÃO MATERNA
- EXPOSTO À UM NOVO AMBIENTE
- EXPRESSAR O SEU POTENCIAL MÁXIMO DE DESENVOLVIMENTO
- INGRESSAR MAIS CEDO À VIDA REPRODUTIVA
- SÃO O FUTURO DA NOSSA PRODUÇÃO



Wolfhard Schulze

PERÍODO DE DESMAME

PRIMEIROS PASSOS:

- INGESTÃO DE COLOSTRO
- PERÍODO COM MÃE
- DESINFECÇÃO DO UMBIGO
- MANEJO DE ACORDO COM A REALIDADE DA PROPRIEDADE

INSTALAÇÕES

- INSTALAÇÕES INDIVIDUAIS : CASINHAS OU BAIAS
- CRIAÇÃO EM CONJUNTO: PRÓS E CONTRAS
- MAMADEIRAS: TIPOS E POSIÇÃO

INSTALAÇÕES INDIVIDUAIS : CASINHAS OU BAIAS



CRIAÇÃO EM CONJUNTO: PRÓS E CONTRAS



MAMADEIRAS: TIPOS E POSIÇÃO



NUTRIÇÃO DAS BEZERRAS

- FENO E ÁGUA DE BOA QUALIDADE
- FORNECIMENTO DO COLOSTRO ATÉ OS 3 DIAS
- VOLUMOSOS DURANTE TODA A FASE DE ALEITAMENTO
- DO NASCIMENTO ATÉ 70 DIAS: 800 GRAMAS DE CONCENTRADO DIÁRIOS
- FORNECIMENTO DO LEITE INTEGRAL DIÁRIO :4 A 6 L/DIA
- DESMAME: DOS 2 AOS 3 MESES
- APÓS O DESMAME: 1 A 2KG DE CONCENTRADO COM 12% A 16% DE PROTEÍNA/DIA



PRÓXIMA FASE

- APÓS OS 6 MESES O RÚMEN ESTÁ COMPLETAMENTE DESENVOLVIDO
- ENTRE 6 E 12 MESES AS BEZERRAS ESTÃO APTAS A SE DESENVOLVEREM SOMENTE A PASTO

CUSTO X BENEFÍCIO

- ESTIMA-SE QUE O CUSTO DA CRIAÇÃO DE UMA TERNEIRA GIRA EM TORNO DE 2.500 R\$

REFERÊNCIAS

- [HTTP://WWW.CPATC.EMBRAPA.BR/PUBLICACOES_2005/CT-38.PDF](http://www.cpatc.embrapa.br/publicacoes_2005/CT-38.pdf)

MUITO OBRIGADO

